


Hautschutzplan gemäß TRGS 401


Was	Wann	Wie	Womit	Wer
HÄNDEDESINFEKTION				
<p>Händedesinfektion</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vor und nach Patientenkontakt - vor Verlassen des Bereichs - nach Toilettenbesuch 	<p>ausreichende Menge des Desinfektionsmittels 30 sec in den trockenen Hände verreiben und auf vollständige Benetzung achten</p> <p>zur Virusinaktivierung Herstellerangaben beachten</p>	Skinman® Soft Spitacid®	Personal
REINIGUNG DER HÄNDE				
<p>Hände waschen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bei Bedarf 	<p>mit Flüssigseife/Schaum waschen und anschließend gut abspülen, mit Einmalhandtuch vollständig abtrocknen</p>	Seraman® medical Manisoft® Manisoft® foam	Personal
HAUTPFLEGE/HAUTSCHUTZ				
<p>Hautschutz/-pflege</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vor Arbeitsbeginn - zwischendurch 	<p>Lotion gleichmäßig verteilen und einziehen lassen</p> <p>Pflegelotion gleichmäßig verteilen und einziehen lassen</p>	Epicare® aqua protect Silonda® lipid	Personal
<p>Hautpflege/-schutz</p>	<ul style="list-style-type: none"> - am Dienstende 	<p>Lotion gleichmäßig verteilen und einziehen lassen</p>	Silonda® lipid	Personal

STANDARDEINREIBEVERFAHREN EN 1500

Beachte: Hände über gesamte Einwirkzeit (30 sec) feucht halten. Das Händedesinfektionsmittel aus dem Spender (Hebel mit dem Ellenbogen betätigen) in die trockene hohle Hand geben (mind. 3 ml).




1 Handfläche auf Handfläche inkl. Handgelenke




2 Rechte Handfläche über linken Handrücken und linke Handfläche über rechten Handrücken



3 Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern



4 Außenseite der Finger auf gegenüberliegende Handfläche mit verschränkten Fingern



5 Kreisendes Reiben des rechten Daumens in der geschlossenen linken Handfläche und umgekehrt




6 Kreisendes Reiben hin und her mit geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche und umgekehrt

Hautschutzplan gemäß TRGS 401


Was	Wann	Wie	Womit	Wer
HÄNDEDESINFEKTION				
<p>Händedesinfektion</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vor und nach Patientenkontakt - vor Verlassen des Bereichs - nach Toilettenbesuch 	<p>ausreichende Menge des Desinfektionsmittels 30 sec in den trockenen Hände verreiben und auf vollständige Benetzung achten</p> <p>zur Virusinaktivierung Herstellerangaben beachten</p>		Personal
REINIGUNG DER HÄNDE				
<p>Hände waschen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bei Bedarf 	<p>mit Flüssigseife/Schaum waschen und anschließend gut abspülen, mit Einmalhandtuch vollständig abtrocknen</p>		Personal
HAUTPFLEGE/HAUTSCHUTZ				
<p>Hautschutz/-pflege</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vor Arbeitsbeginn - zwischendurch 	<p>Lotion gleichmäßig verteilen und einziehen lassen</p> <p>Pflegelotion gleichmäßig verteilen und einziehen lassen</p>		Personal
<p>Hautpflege/-schutz</p>	<ul style="list-style-type: none"> - am Dienstende 	<p>Lotion gleichmäßig verteilen und einziehen lassen</p>		Personal

STANDARDEINREIBEVERFAHREN EN 1500

Beachte: Hände über gesamte Einwirkzeit (30 sec) feucht halten. Das Händedesinfektionsmittel aus dem Spender (Hebel mit dem Ellenbogen betätigen) in die trockene hohle Hand geben (mind. 3 ml).




1 Handfläche auf Handfläche inkl. Handgelenke




2 Rechte Handfläche über linken Handrücken und linke Handfläche über rechten Handrücken



3 Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern



4 Außenseite der Finger auf gegenüberliegende Handfläche mit verschränkten Fingern



5 Kreisendes Reiben des rechten Daumens in der geschlossenen linken Handfläche und umgekehrt



6 Kreisendes Reiben hin und her mit geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche und umgekehrt